

270

SG

A. DEMIDOFF

VOYAGE

DANS LA RUSSIE

MÉRIDIONALE

ET LA CRIMÉE

ATLAS

G
200

RÉSERVE



270

G

CHIFFRE

WIDE

LEISIE


WIDE

FORME

LAS

G

ERVE



G 206¹⁶₌

9 no. 270

VOYAGE

DANS

LA RUSSIE MÉRIDIONALE

ET LA CRIMÉE.

VOYAGE
DANS LA
RUSSIE MÉRIDIONALE
ET LA CRIMÉE,

PAR LA HONGRIE, LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE.

EXÉCUTÉ EN 1857, SOUS LA DIRECTION DE

M. ANATOLE DE DÉMIDOFF.

PAR

MM. DE SAINSON, LE PLAY, HUOT, LÉVEILLE, ROUSSEAU, DE NORDMANN ET DU PONCEAU.

Ouvrage illustré


DE 65 GRAVURES ET D'UN ALBUM DE 78 PLANCHES DESSINÉES D'APRÈS NATURE

PAR RAFFET,

et d'un Atlas de 95 Planches coloriées d'histoire naturelle.

DÉDIÉ A S. M. NICOLAS I^{ER},

EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES.



PARIS,

ERNEST BOURDIN, ÉDITEUR,

RUE DE SEINE-SAINT-GERMAIN, 51.

1842

1870

RECEIVED

ST. LOUIS

THE UNIVERSITY OF MISSOURI


LIBRARY

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

ST. LOUIS

MISSOURI

RECEIVED



Fauna pontica.



Tristes pinx.

Nordmann dirce.

Pardinel sculp.

Sturnus roseus. L.

Gerard. color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Boucard imp.

Fauna pontica.



Nordmann del.

Fournier sc.

Travies pinx.

Motacilla flava, var. melanocephala. Licht.

Publié par Ernest Bourdin Editeur.

Bougaud imp.

Gerard, color.



Travers pinx.

Nordmann del.

Pardinet sc.

Charadrius gregarius, Pall.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin Editeur.

Bougeard imp.



Spalax Pallasii. Nordm.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.

Fauna pontica.



Frank pinx.

Nordmann del.


Fournier sc.

Spalax typhlus, var. *xanthodon*, N

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.

Gerard color.



Frank pinx.

Nordmann del.

Anodouche sc.

Spermophilus citellus, Fr. Cuv.
Var. *Caspiana*.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.


Bougeard imp.




1.




2.^a



2.^d



2.^b




2.^c

Schüler pinx.

Nordmann dir.

Annalouche sculp.


1. *Mus hortulanus*, Nordm. 2. *Sminthus leriger*, Nathus.




1^c




1^e




1^d




2^b




1^e




1^b




2^c



2^c



2^d



2^a

Prêtre pinx.

Nordmann dir.


Oudet sc.

1. *Lacerta taurica*, Pall. 2. *Eremias variabilis*, Fitz.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougard imp.



Pretré pinx.

Nordmann dirav.


Visto sc.

1. *Phrynocephalus auritus*, Eversm. 2. *Pseudopus Pallasii*, pall. Cuv.

Gerard color

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Petre puz.

Nordmann dir.

Oudet sc.


1. *Ophis Eryx*, Fitz. var. *colchica*. 2, 3. *Ejusdem* pullus.
(*Anguis fragilis*, Auctt.)

Gerard color.


Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeart imp.


1.



1 c.





1 a.




1 b.


2.



2 c.



2 a.



2 b.

Schuler pinx.

Nordmann del.


Boissart sc.

1. *Pammophis moniliger*, Schleg. 2. *Dipsas fallax*, Boje.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.




Prêtre pinx.


Nordmann dir.

Visto sculp.


Coluber trabalis. Pall.




2 d.




2.




2 e.



2 a.



2 b.



Blumenstengel pinx.

Nordmann dir.

Le Brun sc.


1. *Calopeltis leopardina*, Fitz. pullus. 2. *Coluber saurematus*, Pall. pullus.

Gerard color.


Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.


Fauna pontica.



AMPHIBIA, Tab. 7.



Blumenstengel & Oudart pinx.




Maniceau sculp.

Gerard color.

Coluber sauremates, Pall.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougard imp.



Calopeltis leopardina, Fitz. (*Coluber quadrilineatus*, Pall.)

Protre pinx.


Nordmann dir.

Forget sc.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Petre pinx.

Nordmann dux.

Pierre sculp.

Calopeltis leopardinus. Fitz.
(*Coluber cruentatus.*) Stev.


Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougourd imp.



Tropidonotus Hydrus, Fitz.



Blumenstengel pinx.

Nordmann del.


Fournier sculp.

Tropidonotus Natrix.
var. nigra.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougard imp.



Prêtre pinx.

Nordmann dir.


Talbault sc.

1. *Tropidonotus Natrix*, var. *Colchica*. 2. *Coronella laevis*, var.


Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.


Bougeard imp.



Frank pinx.



Nordmann dir.





Pierre sculp.

Coronella laevis, Auctt.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougard imp.



Oudart pinx.

Nordmann direx.

Victor sculp.

1. *Percarina Demidoffii*, Nordm. 2. *Lucioperca volgensis*, Cuv.


Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bongcard imp.



2.



Debord pinx.

Nordmann del.

Annotouche sc.

1. *Serranus scriba*, Cuv. 2. *Acerina rospica*, Cuv.

Gerard color.


Publié par Ernest Bourdin. Editeur.

Bougeard imp.

1.



2.



Oudart pinx.

Nordmann del.

Le Brun sc.


1. *Corvina nigra*, Cuv.

2. *Umbrina vulgaris*, Cuv.


Gerard col.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.


Bougeard imp.



1.



2.



Schüler pinx.

Nordmann del.


Arndouche sc.

1. *Sargus annularis*, Cuv. 2. *Charax Pantazzo*, var. *ponticus*.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



P. Oudart pins.

Nordmann dir.

Annedouche sc.

1. *Temnodon saltator* Cuv. 2. *Scomber scombrus* Lin.

Gérard color.


Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.


3.



1.



2.



Frank pins

Nordmann dir.


Forget sc.

1. *Blennius sanguinolentus*, Pall. 2. *Bl. auritus*, Pall. 3. *Bl. lepidus*, Pall.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.


Bougeard imp.



1.



2.



Oudart pinx.

Nordmann del.



Giraud sc.

Gobius melanostomus, Pall.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Éditeur.

Bougeard imp.



Castro pin.

Nordmann dir.


Forget sculp.

Gobius batrachocephalus. Pall.




Derard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.


Bougard imp.



1.



2.



Schüler pinx.

Nordmann direx.








Le Brun sculp.

1. *Gobius lugens*, Nordm. 2. *Gobius constructor*, Nordm.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Schüler pinx.

Nordmann del.

Forget sc.


1. *Gobius exanthematosus*, Pall. 2. *G. ophiocephalus*, Pall. 3. *G. lacteus*, Nordm.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.

1.



2.



Oudart pinx.

Nordmann del.




Forget sc.

1. *Gobius Melanio*, Pall. 2. *G. Ratón*, Nordm.

Berard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bouge, imp.



C. Schüller pinx.

Nordmann dir.







Le Brun sculp.

1. *Gobius Tyrman*, Nordm. 2. *G. Cephalarges*, Pall. 3. *G. marmoratus*, Pall.

Gouard color.

Publié par Ernest Bourdin Editeur

Boucard imp.



Schäfer pinx.

Nordmann dux.


Oudet sculp.

1. *Gobius Stevenii*, Nordm. 2. *Gobius macropterus*, Nordm.
3. *Gobius quadricapillus*, Pall. 4. *Gobius leopardinus*, Nordm.



Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.


Bougeard imp.



1.



2.



Schüler pinx.

Nordmann dir.






Chouard sc.

1. *Gobius platyrostris*, Pall. 2. *Benthophilus macrocephalus*, Eichw.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Schüller pinx.

Nordmann del.

Forget sc.

1, 2. *Callionymus festivus*, Pall. mas adult. 3. *Mura junior*.


4 6. *Lepadogaster biciliatus*, Risso.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.

1.



2.



Oudart pinx.

Nordmann dir.

Annedouche sc.


1. *Chromis castanea*, Cuv. 2. *Labrus prasostictes*, Pall.

General color.


Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.


1.



2.



3.



Schüler pinx.

Nordmann dir.

Forget sc.


1. *Crenilabrus perspicillatus*, Pall. *Acme*. 2. *idem*. *aestate*.
3. *Crenilabrus aeruginosus*, Pall.

Gerard color.


Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.


1.




3.



2.



4.



Blumenstengel pinx.

Nordmann del.

Forget sculp.

1. *Crenilabrus Staitii*, Nordm. 2. *Cr. pusillus*, Nordm. 3. *Cr. Morellii*, Nordm.

4. *Crenilabrus argenteo-striatus*, Nordm.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Oudart pinx.

Nordmann dir.

Annalouche sculp.




Crenilabrus lapina. Cuv.

Gerard color.


Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Lezard imp.

1.



2.



Ch. Frank pinx.

Nordmann del.

Annelouche sc.

1. *Coricus Brama*, Nordm. 2. *C. rostratus*, Cuv. & Val.

Gerard color.


Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.

1.



2.



Frank pinx.

Nordmann. dir.


Pierre sc.

1. *Cyprinus Kollaris*, Heckel. 2. *Abramis Lapa*, Pall.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Acary-Baron pinx.

Nordmann dir.


Annedouche sc.

1. *Abramis Laskyr*, Pall. 2. *A. melanops*, Heckel.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Nordmann sc.

Amedouche sc.

1. *Leuciscus Heckelii*, Nord. 2. *Aspius fasciatus*, Nord.


Proterre pinx.

Gérard color.


Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.


1.



2.



2 a.



Oudart pinx.

Nordmann dir.

Milot sculp.

1. *Pelecus cultratus*, Agass. 2. *Aspius labeoides*, N.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Schüler pinx.

Nordmann dir.

Amandouche sc.

1. *Belone rostrata pontica* 2. *Clupea pontica* Eichw.


Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.


Bougeard imp.



1 b.



2.



Frank pinx.

Nordmann delin.


Gauthier sculp.

1. *Motella triserrata*, Cuv. 2. *Gadus eucrinus*, Nordm.

Goussier color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Oudart pinx.

Nordmann del.

Bocourt sculp.

Platessa luscus. (*Pleuronectes luscus.*) Pall.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Boucard imp.

1.



2.



Nordmann delin.


Annetouche sculp.

1. *Platessa Flesus*, variet. *marmorata*. 2. *Rhombus macoticus*, junior Pall.

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Frank pinx.

Nordmann dir.


M^{re} Schmelz sculp.

Rhombus macroticus, Pall.

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Frank pinx.


Visto sculp.

Rhombus macoticus, var.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Oudart pinx.

Nordmann del.



Visto sculp.

Solea nasuta. (*Neurenectes nasutus*) Pall.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougcard imp.



Ch. Branch pinx.

Nordmann del.



















Annedouche sc.

1. *Syngnathus argentatus*, Pall. 2. *S. tenuirostris*, Rathke. 3. *S. succulentus*, Rathke.

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard Imp.



Cornuel p.

a

b

c

Mandl dir.


Sabin sculp.

Ecailles des Poissons et des Reptiles.
























Gerard color.


Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Écailles des Poissons et des Reptiles.

*Perca fluviatilis*, L.*Percaena Demidoffii*, Nordm.*Mullus barbatus*, L.*Trigla pini*, Bl.*Corvina nigra*, C.*Sargus annularis*, C.*Scomber scombrus*, L.*Mugil cephalus**Atherina hepsetus**Gobius melanicus*, Pall.*Gasterosteus aculeatus*, L.*Aspius rapax*, Agass.*Colitis fopilis*, L.*Esox lucius*, L.*Belone rostrata**Salmo fario*, L.*Engraulis vulgaris*, C.*Gadus cucinus*, Nordm.*Motella tricornata*, C.*Pleuronectes flesus*, L.*Cornet pini**Solea nasuta*, Pall.*Muraena anguilla*, L.*Scincus officinalis**Coluber trimalis*, Pall.*Ecailles des Poissons et des Reptiles.*



Frank pinx.

Nordmann dir.

Mougeot sculp.

Astacus leptodactylus, variet. salinus.

Mas.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Schüler pinx.

Nordmann del.

Millot sc.

1. *Androctonus caucasicus*, N. 2. *A. ornatus*, Nordm.
 3. *Scorpio europaeus, (tauricus)* 4. *S. avhasicus*, Nordm.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



J. G. Prêtre del.

Ronsseau dir.

Forget sculp.

1. 1.^a 1.^b 1.^c *Rhyncholites antiquatus* Nob. 2. 2.^a *Nautilus sinuatus* Sow. 3. 3.^a 3.^b *Ammonites ponticuli* Nob. 4. 4.^a 4.^b *Ammonites Demidoffii* Nob. 5. 5.^a *Ammonites Theodosiae* Nob.
6. 6.^a 6.^b *Ammonites Haotiana* Nob.

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Benoist imp.



Prêtre pinx.

Rouveau del.

Forget sc.

1 à 1^c. *Belemnites ponticus* Nobis. 2. *Aptychus Theodosia* Desh. 3. *Aptychus Cuneiformis* Nobis.

4 à 4^b. *Nummulites polygyratus* Desh. 5 à 5^d. *Nummulites distans* Desh.

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Prêtre pinx.

Nordmann del.

Lea sc.

1. 1^a *Symnea peregrina* Desh. 2 à 2^b *Symnea velutina* Desh. 3 à 3^b *Planorbis rotella* Nobis
 4. 4^a *Paludina casaretti* Nobis. 5 5^a *Paludina achatinoides* Desh. 6 à 6^c *Paludina cyclostoma* Nobis
 7 à 7^b *Valenciennensis annulatus* Nobis.

Gérard col.

Publié par Ernest Bourdin Editeur.


Bougeard imp.



1^a



1^b



Reire pin.

Nordmann dr.

Leu. sc.

Ostrea latissima Desh.

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur

Bougard imp.



3



2



Prêtre pinx.

Mougnot sc.

Nordmann del.

1. 2. 3. *Ostrea mirabilis*. Nobis.

écart color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Boucard imp.



Prêtre pinx.

Rousseau del.












Porget sc.

1. *Mytilus subcarinatus* Desh. 2. *Mytilus inequivalvis* Desh. 3. *Mytilus Angustus* Nobis.
 4. *Mytilus gracilis* Nobis. 5. *Cardium squamulosum* Desh. 6. *Cardium paucicostatum* Desh.

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Boucard imp.



Prêtre pinx.

Nordmann del.

Leu sc.










1. *Cardium Gouiesi* Desh. 2. *Cardium multistriatum* Nobis. 3. *Cardium crassatellum* Desh.

4. *Cardium edentulum* Desh.

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Prêtre pinx.

Nordmann del.

Leu sc.

1. *Cardium angusticostatum* Nobis. 2. *Cardium apertus* Desh. 3. *Cardium acardo* Desh.

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeart imp.



Prêtre del.

Nordmann del.

Leu sc.

1. *Cardium semisulcatum* Nobis. 2. *Cardium crassidens* Nobis. 3. *Cardium macrodon* Desh.
4. *Cardium modiolaris* Nobis.

Reinach color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bourdin imp.



Prêtre pinx.

Rousseau dir.

Mougeot sc.

1. *Cardium crenulatum* Nobis. 2. *Cardium planum* Desh. 3. *Cardium id.* var. *tas*
 4. *Cardium carinatum* Desh. 5. *Eschara lapidorum* Pallas. 5^a grandeur naturelle.
 5^b 5^c 5^d face supérieure (divers états) 5^e 5^f 5^g face inférieure (divers états)

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



J. G. Prêtre pinx.

Rousseau del.




Forget sculp.

Ostrea Defranci Nob.
(*Alectryonia Defranci* Fischer.)

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin Editeur.

Bougeard imp.



Prêtre pinx.

Forget sc.


1. 1^a 1^b *Ostrea mirabilis* Nob. 2. 2^a *Nautilus Leplayi* Nob. 3. 3^a *Baculites gigas* Nob.

Gérard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.





Schüler pinx.

Nordmann dir.

Forget sculp.

Anatomie et développement du Tendra zostericola. Nordm.

Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.

Fig. 4. A.

Fig. 1.



Fig. 2.






Fig. 3.



Fig. 5.



Schüler pinx.

Nordmann dir.



Sévin sculp.

Cellularia avicularia, Pall.


Gerard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



1. *Polyporus Nordmanni* Lév. 2. *Agaricus Anatolii* Lév.
3. *Agaricus Lainsonii* Lév.



Polyporus Steveni Lév.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Boucard imp.



Charal pinx.

L'éveillé dir.


Forget sc.

Polyporus Demidoffii Lév.

Girard col.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.



Chasat pin.

Lévillé dir.

Amédouche sc.

- | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 et 1 ^a | <i>Tulostoma granulosum</i> Lév. | 4. | <i>Tremella gemmata</i> Lév. |
| 2. | <i>Craterellus Comperi</i> Lév. | 5. | <i>Phoma laricis</i> Lév. |
| 3. | <i>Gigartina confervoides</i> Lam. | 6. | <i>Schizoxylon sepincola</i> Pers. |
| | 7. <i>Peziza phaeoloma</i> Lév. | | |

Gérard col.

Publié par Ernest Bourdin Editeur

Bougeard imp



1. *Dothidea phlomidis* Lév.

2. *Dothidea pistaciae* Lév.

3. *Dothidea arundinis* Lév.

4. *Septoria rhois* Lév.

9. *Sphaeropsis conica* Lév.

5. *Stigmella dryina* Lév.

6. *Sphaeria melanostigma* Lév.

7. *Ascochyta acerina* Lév.

8. *Dothidea lathyri* Lév.



1. *Uredo limonii* Duby.

2. *Uredo Decaisnei* Lév.

3. *Phoma Andrachnes* Lév.

4. *Septoria ranunculacorum* Lév.

5. *Erysiphe Taurica* Lév.

6. *Dothidea paliuri* Lév.

7. *Sphacelia segetum* Lév.

1



2



3



Alf. Brongniart del.

Victo. sculp.

1 2. *Fucoides Huotii* Ad. Brong. 3. *Fucoides aequalis var. orientalis* Ad. Brong.

Verard color.

Publié par Ernest Bourdin, Editeur.

Bougeard imp.




Fig. 2

Fig. 14.

Fig. 6.

Fig. 16.

Fig. 5

Fig. 1.

Fig. 8.

Fig. 4.

Fig. 7.

Fig. 13.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 12.

Fig. II.














Fig. 17.

Fig. 10.

Fig. 10.











Dessiné par J. J. N. Huot.

Gravé par Pierre Tardieu.



Dessiné par J. J. N. Huot.

Gravé par Pierre Tardieu.



Dessiné par J. J. S. Ilott

Gravé par Pierre Tardieu

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.





Fig. 4.



Dessiné par J. J. N. Huot.

Chaine de Fagaras

Fig. 5.




Fig. 6.





Fig. 7.



Légende relative à la carte de la Crimée et de l'île de Taman.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pon. Liassique.	Pon. Oolithique.	Pon. Neocomienne.	Pon. du Grès vert.	Pon. Crétacée.	Elage inférieur.	Elage moyen.	Elage supérieur.	Tain Chysmien.	Tain Récent.	Roches Plutoniques.	Pseudo-Volcans.
Terrain Jurassique.				Terrain Crétacé.		Terrain supercrétacé.		Terrain Pyroïde.			

Légende relative à la carte du cours du Danube depuis Vienne jusqu'à Giurgevo sur la route de cette ville jusqu'à Odessa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
T. Granitique.	T. Pyroïde.	T. Schisteux.	T. Carbonifère.	T. Jurassique.	T. Crétacé.	T. Supercrétacé.	T. Chysmien.	T. Récent.
Série Plutonique.								

Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 10.



Gravé par Pierre Tardieu.

Explication des Couleurs et des Signes.




- Terrain de transport récent
 - Terrain d'eau douce
 - Terrain de la mer
 - Terrain ordinaire supérieur
 - Terrain ordinaire inférieur
 - Terrain carbonifère
 - Terrain ordinaire
- (Detailed text explaining geological features and symbols follows in French)*

CARTE GÉOLOGIQUE
DE LA CHAÎNE CARBONIFÈRE DU DONETZ
ET DE SES HUIT GROUPES DE HOUILLÈRES.

DRESSÉE SOUS LES AUSPICES DE M. A. DE DEMIDOFF
PAR M. F. LE PLAY INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES,
Professeur à l'Ecole Royale des Mines de Paris ;

AVEC LA COLLABORATION DE M. M. LUDOVIC, SOUS-DIRECTEUR DES TRAVAUX D'EXPLORATION
pendant les années 1837, 1838 et 1839.

Publiée par Ernest Bourdin, Editeur.



RECHERCHES DE HOUILLE D'ILINKA.


Près de la limite N.E. de la Région Carbonifère - sur la Grande Kamenka - A 6 kilom. du Donetz et à 100 kilom. au N.O. de l'Embouchure de cette Rivière dans le Don - A 23 kilom. à l'O. de Kamenskaïa - dans le IV^e Groupe de Houillères dit de la Lougatchik et de la Kamenka.

PLAN TOPOGRAPHIQUE

DES AFFLEUREMENS CARBONIFÈRES


et du Sondage d'Ilinka.

Fig. 1.



Coupe verticale suivant le trou de Sonde d'Ilinka et la ligne A B du Plan Fig. 1.

Fig. 2.



Prammule.
 Calcaire.
 Schiste.

Echelle du Plan et de la Coupe, Fig. 1 et 2. (au 1/6000^e)


0 30 60 90 120 150 300 450 600 Mètres.

Echelle de la Coupe Fig. 3. (au 1/400^e)

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 Mètres.


Coupe verticale des terrains et des couches de Houille, dans le trou de Sonde d'Ilinka.

Fig. 3.



RECHERCHES DE HOUILLE D'OUST-DOBOVSKOI.

Sur la limite N.E. de la Région Carbonifère, - à 170 mètres seulement du lit du Donetz et à 80 kilom. au N.N.O. de l'Embouchure de cette Rivière, -
à 13 kilom. à l'E.S.E. de Kamenskaïa - dans le V^e Groupe de Houillères dit de Kamenskaïa.



RECHERCHES DE HOUILLE DE ROUBEJNOI.

A l'extrémité orientale de la Région Carbonifère. - à 70^m, 800^m, et 1000^m du lit du Donetz ; à 30 kilom. au N.N.E. de l'embouchure de cette Rivière
près d'Oust-Bouistrinskaja, à 82 kilom. à l'E.N.E. de Novo-Tcherkassk. - dans le VI^e Groupe de Houillères dit du Donetz-Inferieur.


PLAN TOPOGRAPHIQUE DES AFFLEUREMENTS CARBONIFÈRES ET DES SONDAGES DE ROUBEJNOI. Fig. 1.



Coupe verticale suivant les trous de sonde de Roubejnoi et la ligne A B du Plan Fig. 1.

1^{er} Sondage


Fig. 2.



Coupe verticale suivant les trous de sonde de Roubejnoi et la ligne C D du Plan Fig. 1.


1^{er} Sondage

Fig. 3.



Echelle du Plan et des Coupes Fig. 1, 2, 3, 4 et 5 (au 1/6000^e)

Echelle des Coupes Fig. 6, 7 et 8 (au 1/400^e)




RECHERCHES DE HOUILLE DE ROUBEJNOI.


A l'extrémité orientale de la Région Carbonifère - à 70^m, 800^m et 1000^m du lit du Donetz; à 30 kilom. au N.N.E. de l'Embouchure de cette Rivière près d'Oust-Bouistrianskaja, à 82 kilom. à l'E.N.E. de Novo-Tcherkassk. - dans le VI^e Groupe de Houillères dit du Donetz - Inférieur.

Coupes verticales des Terrains et des Couches de Houille dans les trous de Sonde de Roubejnoi.


1^{er} Sondage.
Fig. 6.



2^e Sondage.
Fig. 7.




3^e Sondage.
Fig. 8.




Granite.
 Calcaire.
 Schiste.
 Argile.
 Sable.

Coupe verticale suivant les trous de sonde de Roubejnoi et la ligne E F du Plan Fig. 1.
Fig. 4.



Coupe verticale suivant les trous de sonde de Roubejnoi et la ligne G H du Plan Fig. 1.
Fig. 5.



RECHERCHES DE HOUILLE DE POPOVSKOI.

Près de la limite méridionale de la Région Carbonifère, - sur la Grouchevka - à 25 kilom. du Don et à 86 kilom. à l'E.N.E. de l'Embouchure de ce Fleuve dans la Mer d'Azov - à 32 kilom. au N.N.E. de Novo-Tcherkask - dans le VI^e Groupe de Houillères dit du Donetz-Inferieur.

PLAN TOPOGRAPHIQUE


DES AFFLEUREMENS CARBONIFÈRES ET DU SONDAGE DE POPOVSKOI.

Fig. 1.




Coupe verticale des Terrains et des Couches de Houille dans le trou de Sonde de Popovskoi.

Fig. 3.



Coupe verticale suivant le trou de Sonde de Popovskoi, et la ligne A B du Plan Fig. 1.

Fig. 2.



Psammite

Calcaire.

Schiste.

Echelle du Plan et de la Coupe Fig. 1. et 2. (au 1/6000^e).

0 30 60 90 120 150 300 450 600 Mètres.

Echelle de la Coupe Fig. 3. (au 1/400^e).

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 Mètres.

RECHERCHES DE HOUILLE DE LA RIGUINE.

Près de la limite N.E. de la Région Carbonifère. - à 3 kilom. du Donetz, et à 90 kilom. au N.N.O. de l'Embouchure de cette Rivière.
- A 3 kilom. au S.S.O. de Kamenskaïa. - dans le V^e Groupe de Houillères dit de Kamenskaïa.


PLAN TOPOGRAPHIQUE DES AFFLEUREMENTS CARBONIFÈRES DE LA RIGUINE.

Fig. 1.



Coupe verticale suivant la ligne A B du Plan Fig. 1.

Fig. 2.



Echelle du Plan et des Coupes Fig. 1, 2 et 3 (au 6000^e)

0 30 60 90 120 150 300 450 600 Mètres.




Fig. 3.

Coupe verticale suivant la ligne C D du Plan Fig. 1.


Psammite.
Calcaire.
Schiste.

RECHERCHES DE HOUILLE DE LA GOVENNAIA

Près de la limite N.E. de la Région Carbonifère. — Dans un petit ravin qui débouche à la rive droite du Donetz, à 82 kilom. au N.N.O. de l'embouchure de cette rivière. —
 A 7 kilom. au S.S.E. de Kamenskaïa. — Dans le V^e Groupe de Houillères dit de Kamenskaïa.


PLAN TOPOGRAPHIQUE DES AFFLEUREMENTS CARBONIFÈRES DE LA GOVENNAIA.

Fig. 1.



Coupe verticale suivant la ligne A B du Plan Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle du Plan et de la Coupe Fig. 1 et 2 (au 6000^e).

0 30 60 90 120 150 300 450 600 Mètres.

Psammite.
 Calcaire.
 Schiste.

RECHERCHES DE HOUILLE DE NIJNI-CEBRIAKOV.

*A l'extrémité orientale de la Région Carbonifère, sur la Boustraa, à 3 kilom. du Donetz et à 42 kilom. au N.N.E. de l'Embouchure de cette Rivière.
- à 22 kilom. E.S.E. d'Ekaterinskaja. - dans le VI^e Groupe de Houillères dit du Donetz-Inferieur.*

PLAN TOPOGRAPHIQUE
DES AFFLEUREMENS CARBONIFÈRES
de Nijni-Cébriakov.

Fig. 1.




Coupe verticale suivant la ligne CD de la Fig. 1.

Fig. 3.







Coupe verticale suivant la ligne A B de la Fig. 1.

Fig. 2.




Echelle du Plan et des Coupes Fig. 1, 2 et 3. (au 6000^e)




Bammite. 
Calcaire. 
Schiste. 



Dessiné et gravé par Pierre Tardieu.









CARTE
DE LA
CRIMÉE

Copie d'après Schubert pour accompagner

LE VOYAGE DANS LA RUSSIE MÉRIDIIONALE

par
M. Anatole de Demidoff.

Publiée par Ernest Bourdin, Editeur.

Paris

1841

EXPLICATION DES SIGNES.

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------|
| 38° | Ville | Route de Pétio |
| 37° | Village de 20 maisons ou plus | Grande Route |
| 36° | Hamau de 10 à 20 maisons | Chemins |
| 35° | Hamau de moins de 10 maisons | Plains |
| 34° | Hamau | Montagne |
| 33° | Fortin, hamau, habité | Montagne à l'est |
| 32° | Fortin | Montagne à l'ouest |
| 31° | Monastère | Fort ou Redoute |
| 30° | Fort | |

